

Parasitenbekämpfung beim Pferd

Bekämpfungsmassnahmen gegen Parasiten sind zur Gesunderhaltung der Pferde wichtig. Eine wirksame Bekämpfung ist auf zwei Massnahmengruppen aufgebaut:

1. **Weidehygiene**, d. h. regelmässiges Einsammeln des Kotes auf der Weide (1-2x pro Woche)
2. **Behandlungsstrategie** wenn möglich auf Grund der Resultate der Kotanalyse

Damit uns die Wirkung der Entwurmungsmedikamente möglichst lange erhalten bleibt und wir den Pferden einen optimalen Schutz gegen parasitäre Erkrankungen bieten können, wird von den Universitäten Bern und Zürich eine neue Entwurmungsstrategie empfohlen. Durch die Kotanalyse ist eine gezielte Behandlung unserer Pferde möglich.

Die Pferdeklinik Dalchenhof unterstützt die neue Entwurmungsstrategie mit Kotanalyse. In gewissen Fällen hat auch die bisherige Strategie mit 3 Behandlungen pro Jahr ihre Berechtigung. Lassen Sie sich beraten!

Zeitpunkt	Neue Entwurmungsstrategie – Gezielte Behandlung von verwurmtten Pferden ab dem 5. Lebensjahr		Bisheriges Strategie- Entwurmung aller Pferde
	Untersuchung	Behandlung	Behandlung
April/Mai	Ziel: Berechnung der Wurmeier pro Gramm Kot (EpG) Probenmaterial: Einzelprobe Kot von jedem Pferd	Weniger als 200 EpG: keine Behandlung erforderlich Mehr als 200 EpG: Behandlung mit Equest Pramox®	Equest® (Moxidectin) Wirkungsspektrum: Rundwürmer Magenbremsen Lungenwürmer Ektoparasiten
August/September	Ziel: Berechnung der Wurmeier pro Gramm Kot (EpG) Probenmaterial: Einzelprobe Kot von jedem Pferd	Weniger als 200 EpG: keine Behandlung erforderlich Mehr als 200 EpG: Behandlung mit Equest Pramox®	Equest® (Moxidectin)
Dezember (nach dem ersten Bodenfrost)	Ziel: Behandlung als Sicherheitsmassnahme Keine Untersuchung notwendig	Entwurmung aller Pferde mit Equest Pramox®	Equest Pramox® (Moxidectin / Praziquantel) Wirkungsspektrum: Bandwurm Rundwürmer Magenbremsen Lungenwürmer Ektoparasiten

Bei Zuchtstuten empfiehlt sich der Einsatz von Equest® (Moxidectin) etwa 4 Wochen vor dem Abfohlen. Fohlen sollten erstmals im Alter von 4 bis 8 Wochen, danach alle 2 Monate bis zum Alter von 6 bis 12 Monaten behandelt werden. Für Fohlen besonders geeignet ist Panacur® (Fenbendazol), nach dem Absetzen auch Equest® (Moxidectin) und ab dem 1. Lebensjahr auch mit Equest Pramox® (Moxidectin / Praziquantel).